



ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลัง



สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีคำแนะนำดังนี้

มันหันตกภัย โรคใบด่างมันสำปะหลัง

อาการ :



ใบด่างเหลือง ฝิดรูปยอดแตกใหม่ แสดงอาการต่างเหลืองชัดเจน ลำต้นแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต

การแพร่ระบาด :



1. ก้อนพันธุ์ จากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค
2. แมลงหึ่งขาวยาสูบ นำเชื้อไวรัสจากต้นเป็นโรคไปสู่ต้นปกติ

มรปฏิบัติเพื่อกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

1. **สำรวจแปลงมันสำปะหลังของตนเองอย่างสม่ำเสมอ**
หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่าง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้เคียงทันที

2. **กำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหึ่งขาวยาสูบ**

- ก่อนทำลายต้นที่เป็นโรค
- พันสารเคมีกำจัดแมลงหึ่งขาวยาสูบ ดังนี้
 - อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 - ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 - ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

3. **คัดเลือกก่อนพันธุ์สะอาด**

ใช้ก่อนพันธุ์จากแปลงที่ไม่เคยเป็นโรค หรือใช้ก่อนพันธุ์ที่ทราบแหล่งที่มา

ความเสียหาย :

มันสำปะหลังไม่สร้างหัว หัวลีบเล็ก หรือหัวไม่มีเปิง ผลผลิตลดลง หากเป็นโรคตั้งแต่ระยะต้นเล็ก **จะเสียหายถึง 80-100%**

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในนามของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ