



ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืช



มันสำปะหลัง มักได้รับผลกระทบจากสารกำจัดวัชพืชที่ใช้พ่นเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้มีการปลิวของละอองสาร (spray drift) มาสู่แปลงปลูกมันสำปะหลัง นอกจากนี้ ยังเกิดขึ้นได้จากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเอง มีการใช้สารไม่ถูกต้อง เช่น พ่นไดยูรอนเพื่อควบคุมวัชพืช หลังจากที่มีมันสำปะหลังออกแล้ว ทำให้เกิดความผิดปกติ

สารกำจัดวัชพืชชนิดที่เป็นปัญหาต่อมันสำปะหลังที่พบบ่อยครั้ง ได้แก่ 2,4 ดี อามีทริน อาทราซีน ไกลโฟเสท ไดยูรอน และพาราควอท ทำให้มันสำปะหลังแสดงอาการผิดปกติในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารและกลไกในการทำลายของสารนั้น ๆ

2,4-ดี (2,4-D) อาการผิดปกติขึ้นกับปริมาณสารที่ได้รับ เช่น ใบยอดไม้คลี่ ใบผิดรูป ยอดโค้งงอ ก้านใบลู่ลง ใบบิดหงายขึ้น ใบเหลือง ใบไหม้ ยอดไหม้ ก้านใบและลำต้นบวม เห็นรอยสีขาว หากได้รับสารปริมาณมากทำให้ใบไหม้ ยอดไหม้



อามีทริน (ametryn) ทำให้มันสำปะหลังมีอาการใบเหลือง ใบไหม้ หากได้รับสารในปริมาณมากทำให้ยอดไหม้ กิ่งแห้งตาย



อาทราซีน (atrazine) ทำให้มันสำปะหลังมีอาการใบเหลือง ใบไหม้ หากได้รับสารในปริมาณมาก ทำให้ยอดไหม้ กิ่งแห้งตาย



ไดยรอน (diuron) ทำให้ใบเหลือง ใบไหม้ หากรากมันสำปะหลังดูดสารจากทางดิน ทำให้เส้นใบเป็นรอยไหม้ สีน้ำตาลอ่อน และต่อมาใบไหม้



ไกลโฟเสท (glyphosate) ทำให้ใบมันสำปะหลังมีขนาดเล็ก แผ่นใบแต่ละหยักแคบเรียวยาวเล็กเป็นเส้น ต้นแคระแกรน



พาราควอท (paraquat) ทำให้ใบไหม้เป็นจุดหรือลามติดกันแล้วแต่ขนาดละอองสารที่ได้รับ ในมันสำปะหลัง บางพันธุ์เมื่อสารสัมผัสโดนส่วนเนื้อเยื่อเจริญขณะต้นเล็ก ทำให้มีการแตกกิ่ง ใบมีแค่ 1-2 หยัก



ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์